Byblis: Kultivace/pÄ›stovÃ¡nÃ-

PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Radek Kastner
[08.01.2008]
AktualizovÃ¡no [04.07.2008]

O: Byblidy majÃ- rÃ¡dy o nÄ›co suÅ¡Ã- podmÃ-nky, neÅ¾li typickÃ© rosnatky.

Zleva: Byblis gigantea, semenÃ-k B. liniflora a semena B. liniflora

Foto Galleria CarnivoraÂ©Barry Rice

Pokud vynechÃ¡me poznÃ¡mky k pÄ›stovanÃ- uvedenÃ© nÃ-Å¾e, mÅ¯Å¾eme Å™Ã-ct, Å¾e to jsou sluncemilovnÃ© a mrÃ¡z
masoÅ¾ravÃ© rostliny a pokud tyto podmÃ-nky splnÃ-te, nemÄ›l by bÃ½t problÃ©m s pÄ›stovÃ¡nÃ-m. OvÅ¡em jinak Å™eÄ•en
pÅ™Ã-rodÄ› jsem vidÄ›l rostliny z tohoto rodu pouze jedinkrÃ¡t, Å¡lo o Byblis gigantea, kterÃ© rostly stejnÄ› dobÅ™e jak na vlhk
pÃ-sku tak v nÃ¡razovÄ› se objevujÃ-cÃ-ch, mÄ›lkÃ½ch tÅ¯ÅˆkÃ¡ch. Aby bylo jasno, opravdovÃ© tajemstvÃ- pÄ›stovÃ¡nÃ- tÄ›ch
netkvÃ- pouze v tom, jakÃ© jsou samotnÃ© detaily, tÃ½kajÃ-cÃ- se vlhkosti.

Komplex B. liniflora je pÄ›stovatelnÃ½ snadno. RostlinÃ¡m pÅ™Ã-liÅ¡ nezÃ¡leÅ¾Ã- na sloÅ¾enÃ- substrÃ¡tu, ale nejlepÅ¡Ã- zku
jsem mÄ›l, kdyÅ¾ jsem je pÄ›stoval ve smÄ›si pÃ-sek : raÅ¡elina v pomÄ›ru 2:1. OvÅ¡em rostou velice dobÅ™e v mokrÃ½ch
substrÃ¡tech, jako je napÅ™Ã-klad Ä•istÃ½ raÅ¡elinÃ-k, tedy jak vidÃ-te, sloÅ¾enÃ- substrÃ¡tu nenÃ- rozhodujÃ-cÃ-. Je jim pro
jedno, jestli sedÃ- ve vodÄ›. Co je vÅ¡ak dÅ¯leÅ¾itÄ›jÅ¡Ã- zÃ¡leÅ¾itost, zasadit rostliny do vÄ›tÅ¡Ã-ch kvÄ›tnÃ-kÅ¯, v prÅ¯mÄ›r
cm. MenÅ¡Ã- kvÄ›tinÃ¡Ä•e vedou k tomu, Å¾e i rostliny v nich jsou znatelnÄ› menÅ¡Ã-. I kdyby byly rostliny drobnÃ©, nepÅ™es
je, nemajÃ- to opravdu rÃ¡dy!

DalÅ¡Ã-m problÃ©mem je, Å¾e dokud jsou jen nÄ›kolik cm velkÃ©, jsou velmi nÃ¡chylnÃ© k plÃ-sÅˆovÃ½m onemocnÄ›nÃ-m, k
mohou Ä•asto zahubit.

Byblis gigantea (a pÅ™edpoklÃ¡dÃ¡m, Å¾e aÄ•koliv jsem ji nikdy nepÄ›stoval, i B. lamellata) preferujÃ- vopravdu velkÃ© kvÄ›tin
vÃ½raznÄ› pÃ-skovou smÄ›sÃ- substrÃ¡tu a zÃ¡livku pouze shora.

MÅ¯Å¾e to bÃ½t celkem i trik, pÅ™inutit Byblis k produkci semen. Byblis liniflora vytvÃ¡Å™Ã- semena Ä•asto bez jakÃ©koliv
intervence a zÃ¡sahu (minimÃ¡lnÄ› ty formy, kterÃ© se objevujÃ- v bÄ›Å¾nÃ© kultivaci). OstatnÃ- druhy se jevÃ- jako cizospraÅ
coÅ¾ znamenÃ¡, Å¾e potÅ™ebujete nÄ›kolik rÅ¯znÃ½ch jedinců danÃ©ho druhu. ÄŒasem jsem pÅ™iÅ¡el na to, Å¾e existu
spÅ™Ã-znÄ›nÃ© skupiny rostlin v mÃ© sbÃ-rce a ty ztrÃ¡cÃ- bÄ›hem nÄ›kolika let svou vitalitu. Pro toto nemÃ¡m Å¾Ã¡dnÃ© Å™
toho, udrÅ¾et dostateÄ•nÄ› velkou skupinu rostlin, abyste si zajistili dostateÄ•nÄ› velkou genetickou rozmanitost. CoÅ¾ nenÃ-
samozÅ™ejmÄ› problÃ©m kaÅ¾dÃ©ho pÄ›stitele, protoÅ¾e napÅ™Ã-klad sÃ¡m velkÃ½ Isao Takai z Japonska udÄ›lal opravd
kousky s jeho B. filifolia a vytvoÅ™il opravdu nÃ¡dhernou, bohatÄ› kvetoucÃ- formu.

Existuje takÃ© srandovnÃ-, ale nepostradatelnÃ¡ metoda opylovÃ¡nÃ-, kterÃ¡ vyÅ¾aduje pouÅ¾itÃ- ladiÄ•ky k tomu, aby se vyt
pyl z tyÄ•inek. To je prostÄ› skvÄ›lÃ©, protoÅ¾e to patÅ™Ã- k pÅ™Ã-bÄ›hÅ¯m o nutnosti vyuÅ¾itÃ- vÄ•elÃ-ho bzukotu pÅ™i o
historka mÅ¯Å¾e bÃ½t moÅ¾nÃ¡ pravdivou, ale v kultivaci nenÃ- nutnÃ© vyuÅ¾itÃ- ladiÄ•ky.

Pro zvÃ½Å¡enÃ- klÃ-Ä•ivosti semen, speciÃ¡lnÄ› u B. gigantea, mÅ¯Å¾e bÃ½t vyÅ¾adovÃ¡no pouÅ¾itÃ- kyseliny giberelovÃ©
simulace poÅ¾Ã¡ru v kvÄ›tnÃ-ku (zapÃ¡lenÃ- kouskÅ¯ jemnÃ©ho papÃ-ru nebo tÅ™eba usuÅ¡enÃ© trÃ¡vy). Pro dalÅ¡Ã- inform

pÅ™eÄ•tÄ›te mÅ¯j Ä•lÃ¡nek o pÄ›stovÃ¡nÃ- tÄ›chto rostlin.

Page citations: Conran, J.G. et al. 2002; Hartmeyer, S. 1997, 1998; Lowrie, A. & Conran, J.G. 1998; Rice, B.A. 1993, 2006a; Schlauer, J. 2002; personal observations.

Revised: January 2007

Â©Barry Rice, 2005