

Nepenthes: problematika ochrany

Přátelství - spolek přátel Radek Kastner
[18.04.2008]
Aktualizováno [28.06.2009]

O: Nejurgentnější problém, který se týká ochrany tohoto rodu, je nejen problém rodového prostředí, prvotně kvůli praktickým problémům těžby dřeva a rozšíření zemědělství.

Malajsie - Kerangas (většinou N. albomarginata, N. ampullaria, N. rafflesiana)

Lokalita většinou N. albomarginata, NP Bako, Malajsie

Foto © Richard Pichl

Zatímco některé druhy toto narušení prostředí oceňují a další se jim díky tomu rást skvěle, zatímco ty druhy, které pro svou vegetaci vyžadují prostředí vrcholkové lesa, jsou pod tlakem a problémů se jim ve vytvářeném prostředí nedaří. Područní formy rodového prostředí tvoří stavba silnic, infrastruktury a domů.

Nepenthes nejsou adaptovány na půdy, tudíž jakmile jejich prostředí shoje, Nepenthes většinou trpí. Oheň se bohužel často používá i na jejich prostředí od lesa.

Globální změny klimatu budou mít, prozatím neznámý efekt na tyto rostliny. Zrůstající sucha bude například znamenat větší pravděpodobnost požárů.

Všechny druhy tohoto rodu se nacházejí na seznamu CITES Appendix II (příloha II), vyjma Nepenthes khasiana a Nepenthes rajah, které jsou zařazeny do seznamu CITES Appendix I (příloha I). Logika zařazení na tyto seznamy mi není zcela jasná! Všechny klasifikace je díky ICPS Imperiled Carnivorous Plant Species List (Seznam ohrožených druhů masožravých rostlin Mezinárodní organizace přátel masožravých rostlin, pozn. příloha).

Příkladem jednoho z nejvíce ohrožených druhů je Nepenthes clipeata a pro tuto rostlinu vytvořila ICPS (International Carnivorous Plant Society - Mezinárodní organizace přátel masožravých rostlin, pozn. příloha) záchranový program, ve kterém se snaží udržet tento druh a to minimálně v kultivaci.

Sbírání masožravých rostlin hraje opravdovou roli při záchraně těchto rostlin. Expertní přátelé mohou pracovat společně, aby zajistili reprezentaci extrakčních rostlin ve sbírkách. Pokud budou takovéto rostliny snadno

dostupn pro pstovn, budou mt botanick zahrady snadn pstp k tmto rostlinm a nebudou se snait doplovat a roziovat sbrky sbrem z pstrody. Bohuel nkte pstitel masoravch rostlin jsou zapojeni do pytlctv a paovn tchto rostlin. Znovu a znovu slyme o tom, jak byly vzcn rostliny ukradeny z divoiny a tak jsou omezen populace rostlin nieny dil a dil.

Opravdu uboh je, e nkte sbratel, aby doplnili sv sbrky, jsou schopni ukrst i herb ov poloky (t. j. mrtv jedince z rostlinch muze) vzcnch druh.

Je zde nepebn mnostv- mezinrodnch zdroj Nepenthes a ty nabzej velmi vzcn, zajmav druhy. Nen ovem vdy zcela jasn jejich zdroj a j bych celkem rid vdl, zda pisp-vaj k ochran tm, e pstuj rostliny, aby byly vce pstp, nebo pisp-vaj k pytlctv- zvyovnm zjmu o pstovn tchto rostlin. I kdy protentokrt doporuuji podvat se na sil Roberta Cantleyho (Borneo Exotics) na Sri Lance a jeho pstkladnou prci s Nepenthes pmi jejich pstovn.

Page citations:

Cantley, R., et al. 2004; Clarke, C. 1997, 2001; Hilton-Taylor, C. 2000; Rice, B. 2003c, 2006a; Schlauer, J. 2002; personal observations.

Revised: April 2007

Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

DODATEK

Jako dodatek lnku o ochran a ohroen lkovek naleznete ne na tto strnce soubor fotografi, kter n Martin Dank z Univerzity Palackho v Olomouci na svch cestch po Borneu. Tentokrt na snmcch nevidte dn lkovky, ale spe jednu z pst-in, kter vrazn men tv, charakter a intenzitu zalesnn Borneu intenzivn tba deva a vstavba silnic. Podle Martina Danka jsou schopni mstn devorubci vytvoit bu "cestu" pralesem kvli jednomu, dvma stromm, kter maj vzcn a dobe zpeniteln devo.

Paradoxem je, e tato innost ne vdy lkovkm vrazn kod- (nejde-li pst-mo o druhy epifytick), vzhledem e vytvoench prolukch, svtlinch a podl vytvoench cest vznik vhodn prosted- pro mnoho lkovek.

Z dlouhodobho pohledu je to vjak problm zsadn, proto e dky odlesovn se postupn mn- podnebn- podmnky, mon intenzita srek nebo vlhkost i teploty. Cel dopad nen mono dnes zcela dobe odhadnout.

Horské lávky by neměly být tímto intenzivním způsobem a rozvoje zasaženy.

Obecně největší hrozbou je však pytláctví na lokalitách, pátá-padná velká pátá-rodná katastrofy a rozvoj průmyslu - hlad po pozemcích nebo znečištění prostředí.

Radek Kastner

Snímky z Bornea, z míst v blízkosti lávek

Foto © Martin Daněk