

Roridula: druhy

Přátelství-spřátelství vek přátelství Radek Kastner
[14.05.2008]
Aktualizováno [14.05.2008]

O: Existují- pouze dva
druhy a není- známo, že by se křídla-šly.

Obě
rostliny jsou dávkovány křídly, které vytvářejí dlouhé, široké listy, pokryté
pryskyřičnými kapičkami. Rostliny jsou zelené nebo luteo-ervené. Rozdíly mezi
oběma rostlinami jsou uvedeny níže.

Roridula dentata L.

Větší- z obou druhů. Máže dorůst do výšky dvou metrů a její listy jsou
až 5 cm dlouhé a 1 mm široké. Listy mají boční zuby. Květy jsou na dlouhých
stopkách s okvětními lístky dlouhými kolem 12 mm. Rostlina se vyskytuje
v horách Cape Fold v okresech Tulbagh, Ceres a Clanwilliam, ve výškách od
900 do 1200 m. n. m. Šdajně se vyskytuje na lokalitách zvaných fynbos (popis
viz sekce Roridula: rozšíření- a problematika ochrany, pozn. překl.), které jsou větve vyprahlé než ty, které
v rstu podporují Roridula gorgonias.

Roridula dentata

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

Roridula gorgonias Planch.

Křídlo vysoké až 40 cm, s neozubenými listy, které jsou dlouhé až 12 cm.
Květy mají okvětní lístky dlouhé až 15 mm a jsou na krátkých stopkách. Rostliny
se vyskytují v mokřinách, prameništích nebo rašelinných mokřinách. Toto
prostředí je daleko vlhčí a větve u pobřeží, než lokality, na kterých roste Roridula dentata. V slovně se vyskytuje
okresech Somerset
West, Stellenbosch, Caledon a Swellendam, v nadmořské výšce od 100 do 900
m.

Roridula gorgonias

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

Page
citations: Carlquist, S. 1976; Obermeyer, A.A. 1970.

Revised: June 2007

©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner