

Roridula: rozšíření a problematika ochrany

Přispěvek páně Radek Kastner
[14.05.2008]
Aktualizováno [28.06.2009]

O: Obě rostliny, *R. dentata* a *R. gorgonias*, se vyskytují pouze v Cape Province v Jihoafrické republice.

Roridula dentata (vlevo) a *Roridula gorgonias*

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

Ve vnitřní části druhu vegetační komunity, která bývá označována jako fynbos, je to křovinatá zóna, která osidluje chudší a je udržována opakovanými požáry ve frekvenci 4-60 let.

Tyto rostliny nejsou zahrnuty do červené knihy ohrožených druhů Jižní Afriky z roku 1966, tudíž byste si mohli myslet, že nepatří mezi ohrožené. Bohužel v jak na mnoha lokalitách, kde se dříve vyskytovala *Roridula dentata*, ji nepanujících podmínek, které by tímto rostlinám vyhovovaly. Něco je odtud vytlačeno a v důsledku toho, že tímto impulsem byla změna etnosti a intenzity požárů. Vzhledem k tomu, že *Roridula* je adaptována na život v oblastech ohroženými požáry, došlo nejspíše ke změně jejich frekvence v divočině díky suchu a také během úpatních vegetačních sezón k eliminování těchto rostlin.

Page citations:

Carlquist, S. 1976; Cowell, C. undated; Hilton-Taylor, C. 1966; Opel, M. 2005.

Revised: June 2007

© Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner