

O intenzitě světla.

Přemysl-spávek přemysl Radek Kastner
[26.06.2008]
Aktualizováno [26.06.2008]

O: Jak jsem již dříve řekl dříve, je kritické, naprosto kritické, abyste dali vašim rostlinám dostatek světla.

Pokud dáte vašim rostlinám dostatek světla, budou mít dostatek energie a budou velmi silné. A pokud jsou silné, budou schopny vydržet jinou případnou chybu. Použijte-li mnoho vody? Dobře osvětlíte rostliny se o to tolik starat nebudou! Ale rostliny v temných podmínkách budou reagovat na oxidaci - substrátu rychleji - zhroutí se, nežli balíček na kaktusu.

V následujícím vstupu FAQ hovoříme o kvalitě světla, ale nejprve chci hovořit o intenzitě světla. Protože to je to, co potřebujete - intenzivní, Intenzivní, INTENZIVNÍ světlo.

Masožravé rostliny na přímém slunci (zleva): *Drosera anglica*, *Darlingtonia californica* a *Dionaea muscipula*

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

Masožravé rostliny v rodě rostou často na přímém slunci. Existují však i samostatně, ale každopřípadně ty rostliny, které by zašly - některé - jako *Dionaea muscipula* (mucholapka podivná), rosnatky jako *Drosera capensis* a některé z rostlin s listy jako jsou *Sarracenia* (řipirlice), ty všechny mají rádi přímé slunce.

Pokud máte jasné osvětlení sklenek bez přímého světla - barevného zastínění, měli byste být v pohodě, pokud jste schopni rostlinám dodat 10-16 hodin slunečního světla. Pokud jste natolik již zastíněni, že byste měli být v takových klimatických podmínkách, ve kterých máte potřebovat masožravé rostliny venku, 10-16 hodin přímého, nefiltrovaného světla je receptem i pro vás.

Ale so taková - lidem, kteří rostliny uvnitř? To představuje větší - větší. Je nepravděpodobné, že budete mít možnost, která dostává dostatek jasného, slunečního světla, takže budete potřebovat se vybavit umělým osvětlením. A musíte si ho pořádně opravdu hodně! Světlo filtrované přes okno není dostatečné, pokud možná nehovoříme o atriu, které je tak jasné, že mrkáte

v kuse vÁ¾dy nÁ¾kolik minut pokaÁ¾dÁ©, kdyÁ¾ tam vstoupÁ-te.

LidÁ© mi Á¾asto posÁ-lajÁ- dotazy typu: "Bude mÁ¾i dvouÁ¾Á¾rovkovÁ¾i svÁ¾telnÁ¾i aparatura vytvÁ¾Á¾met dostatek svÁ¾tla, pokud ji budu pouÁ¾Á¾vat jako doplnÁ¾k filtrovanÁ¾ho sluneÁ¾nÁ¾ho svÁ¾tla?" Jak bych to mohl vÁ¾dÁ¾t? To zÁ¾leÁ¾Á¾- na tom, jak blÁ¾zko Á¾Á¾rovkÁ¾m rostliny mÁ¾ite, jak jsou vaÁ¾je okna Á¾istÁ¾i a na nepÁ¾ebernÁ¾m mnoÁ¾stvÁ¾- dalÁ¾Á¾ch vÁ¾cÁ¾-. Bylo by to skvÁ¾lÁ¾©, kdybychom vÁ¾ichni vlastnili jednoduchÁ¾ pÁ¾Á¾stroj na mÁ¾Á¾enÁ¾- intenzity svÁ¾tla (podobnÁ¾ jako vÁ¾ichni mÁ¾ime teplomÁ¾ry na mÁ¾Á¾enÁ¾- teploty). Byl bych schopn vÁ¾im pouze Á¾Á¾ct lumenÁ¾- nebo stopovÁ¾ch kandel potÁ¾ebujete. Ale takovÁ¾½ pÁ¾Á¾stroj nemÁ¾ime. TakÁ¾e mÁ¾ite smÁ¾lu.

Ah, ale nemÁ¾te smÁ¾lu Á¾oplnou, pro vÁ¾s jsem vytvoÁ¾il svÁ¾j FAQ a snaÁ¾Á¾m se vÁ¾im pomoci. TakÁ¾e jsem ze zoufalstvÁ¾- pro vÁ¾s vytvoÁ¾il pÁ¾Á¾ibliÁ¾nÁ¾½, velice pÁ¾Á¾ibliÁ¾nÁ¾½, kalkulÁ¾tor, zda mÁ¾ite alespoÁ¾ vzdÁ¾lenÁ¾ akceptovatelnou intenzitu svÁ¾tla pro vaÁ¾je masoÁ¾ravÁ¾ rostliny. Ale abych vÁ¾im mohl pomoci, musÁ¾te pouÁ¾Á¾t fotoaparÁ¾it, kterÁ¾½ mÁ¾i expozimetr/osvitomÁ¾r. Nehraje roli, zda jde o digitÁ¾lnÁ¾- nebo analogovÁ¾½. UjistÁ¾te se, Á¾e vÁ¾te, jak ho pouÁ¾Á¾vat, vzhledem k tomu, Á¾e jÁ¾i vÁ¾im to neÁ¾eknu. Nebudete poÁ¾izovat Á¾Á¾dnÁ¾© aktuÁ¾lnÁ¾- fotografie, prostÁ¾ jen pouÁ¾ijete expozimetr.

MasoÁ¾ravÁ¾ rostliny na pÁ¾Á¾-mÁ¾m slunci (zleva): Pinguicula caerulea, Sarracenia alata a Utricularia macrorrhiza

Foto Galleria CarnivoraÁ¾Barry RiceÁ¾

PouÁ¾itÁ¾- Barryho skvÁ¾lÁ¾ho svÁ¾telnÁ¾ho kalkulÁ¾toru.

Krok 1: UspoÁ¾Á¾dejte celou vaÁ¾ji pÁ¾stítelskou situaci pÁ¾esnÁ¾ tak, jak byste ji chtÁ¾li mÁ¾t i s instalovanÁ¾mi rostlinami. ZapnÁ¾te osvÁ¾tlenÁ¾-, nebo odhrÁ¾te zÁ¾ivÁ¾sy, zÁ¾iclony, nebo udÁ¾lejte cokoliv co plÁ¾nujete udÁ¾lat proto, abyste zÁ¾skali svÁ¾tlo.

Krok 2: UmÁ¾stÁ¾te bÁ¾lou papÁ¾rovou Á¾tvrtku na plochu do pÁ¾stebnÁ¾ho prostoru. UjistÁ¾te se, Á¾e je to pÁ¾esnÁ¾ v tÁ¾ vÁ¾½Á¾ice, ve kterÁ¾© chcete mÁ¾t listy rostlin, nebo v jakÁ¾ listy rostlin uÁ¾ mÁ¾ite, a nikoliv v Á¾rovni dna kvÁ¾tinÁ¾Á¾. PouÁ¾ijte velkÁ¾½ list jemnÁ¾ho, Á¾istÁ¾ho, matnÁ¾ho papÁ¾ru. NemÁ¾ly by na nÁ¾m bÁ¾t linky ani Á¾Á¾dnÁ¾© pÁ¾-smo á¾“ prostÁ¾ pouze prÁ¾zdnÁ¾½ list bÁ¾lÁ¾ho papÁ¾ru.

Krok 3: Nastavte citlivost vaÁ¾jeho fotoaparÁ¾tu na ISO 100, nebo pokud mÁ¾ite digitÁ¾lnÁ¾- kameru, nastavte na citlivost 100. Pokud chcete nastavit citlivost vaÁ¾jeho fotoaparÁ¾tu na nÁ¾jakou jinou citlivost, jako napÁ¾Á¾klad 200 nebo 400, mÁ¾Á¾ete to udÁ¾lat. MÁ¾ kalkulÁ¾tor na to dÁ¾j pozor za vÁ¾s.

Krok 4: Nastavte clonu vaÅ¡eho fotoaparátu na F8.

Krok 5: Dávejte se pÅ™es hledáček fotoaparátu a pÅ™ibliÅ¼te se natolik ke kusu bÃ¡lÃ©ho papÃ¡ru, Å¾e ten zaplnÃ© celÃ© pole vaÅ¡eho vÃ½hledu. NezÃ¡leÅ¼te na tom, zda se pÅ™ibliÅ¼te pomocÃ© fokusu, jak daleko jste od papÃ¡ru nebo jakÃ½ typ Å•oÅ•ek pouÅ¼Ã¡te. ProstÅ› se jen ujistÅ›te, Å¾e papÃ¡r zaplnÃ©uje celÃ© pole vÃ½hledu a Å¾e neblokujete zdroje svÃ©tla ve chvÃ©li, kdy toto Å•inÃ©te. Pokud snÃ¡mÃ¡te pÅ™es stÃ¡ny vitrÃ©ny, ujistÅ›te se, Å¾e je sklo Å•istÃ© a bez kondenzovanÃ© vody Å•i pÃ¡ry.

Krok 6: OvÃ©Å™te si, Å¾e mÃ¡te stÃ¡le nastavenou clonu F8 (ta se obÃ¡as mÃ¡Å¼e automaticky zmÃ©nit, pokud pouÅ¼Ã¡te Å•oÅ•ky se zoomem). PodÃ©vejte se na Å•as expozice, na kterÃ½ je vÃ¡Å¡ fotoaparát nastaven, napÅ™Ã¡klad 1/30 sekundy, nebo 1/2 sekundy, nebo cokoliv jinÃ©ho. Zaznamenejte si nastavenou citlivost, kterou jste pouÅ¼ili a expoziÃ©nÃ© Å•as, kterÃ½ vÃ¡m vÃ¡Å¡ fotoaparát doporuÃ©il.

Krok 7: PodÃ©vejte se na tabulku nÃ©Å¼e. Vyberte si buÅ›ku s citlivostÃ©, kterÃ©j odpovÃ©dÃ¡j tomu, co jste pouÅ¼ili. Potom najdÃ©te Å™Ã¡dek, kterÃ½ odpovÃ©dÃ¡j expoziÃ©nÃ©mu Å•asu, kterÃ½ vÃ¡m doporuÃ©il fotoaparát. Na pÅ™Ã©seÅ•Ã©ku vaÅ¡eho Å™Ã¡dku a sloupce najdete procentuÃ¡lnÃ© vyjÃ¡dÅ™enÃ©. Toto procentuÃ¡lnÃ© Å•Ã©slo je "Barryho Faktor", pojmenovanÃ½ po Å•lovÃ©ku, kterÃ½ napsal tento FAQ.

UrÃ©ujÃ©cÃ© Barryho Faktor

100

200

400

1/4

3%

2%

1%

1/8

6%

3%

2%

1/15

13%

6%

3%

1/30

25%

13%

6%

1/60

50%

25%

13%

1/125

100%

50%

25%

1/250

200%

100%

50%

1/500

400%

200%

100%

Připravte si předem, protože jste použili nastavení citlivosti fotoaparátu na ISO 200 a clonu F8, fotoaparát namířte-li na tabulku v 1/2 je, uvidíte, že váš Barryho Faktor je 50%. To znamená, že nabízejte rostlinám světelnou situaci, která jim dává pouze 50% (nebo 1/2) toho světla, které světelnou rostlinám poskytují. Pokud je váš Barryho Faktor nižší než 25%, litují vaše rostlin.

Aligátor na pÅ™mÅ™m slunci...

Foto Galleria CarnivoraÅ©Barry RiceÅ

NeÅ™mÅ™m zde pÅ™mesnÅ™, co je adekvÅ™tnÅ™ - Å©Ž Barry FatorÅ©. Moje Å™ena pÅ™stuje svÅ©tuÅ©nice (Pinguicula) a lÅ™kovky (Nepenthes) s Å©Ž Barryho FaktoremÅ© kolem 70% a tÅ™m se prostÅ™ daÅ™m. Ale jÅ™ pÅ™stuji Å™pirlice (Sarracenia), vodnÅ™- bublinatky (Utricularia) a a mucholapku (Dionaea), a ty potÅ™ebujÅ™- mnoÅ™stvÅ™- svÅ™tla.

NÅ™kolik pozorovÅ™nÅ™- na zÅ™vÅ™r. Nastavil jsem svou tabulku svÅ™telnÅ©ho kalkulÅ™toru za pouÅ™itÅ™- zÅ™mÅ™ivek starÅ™ch asi dva roky. Ty uÅ™mÅ™ly bÅ™t dÅ™vno vymÅ™ny! NovÅ© svÅ™telnÅ© zÅ™mÅ™ivky jsou daleko jasnÅ™jÅ™Å™- neÅ™ ty starÅ©, coÅ™ byste mÅ™li brÅ™it v potaz, pokud usilujete o kaÅ™dÅ™ foton. ZadrhÅ©, dokonce i mÅ© jasnÅ© terÅ™rium je jednoznaÅ™nÅ™- temnÅ© v porovnÅ™nÅ™- s pÅ™mÅ™m slunce. PÅ™mÅ™m slunce mÅ™ Å©Ž Barryho FaktorÅ© kolem 3700%! TakÅ™e i moje takzvanÅ© zÅ™mÅ™ivÅ© terÅ™rium je tmavÅ©, tmavÅ©, tmavÅ©.

Pokud spÅ©hÅ™te na stropnÅ™- osvÅ™tlenÅ™- v mÅ™stnosti, aby osvÅ™tilo vaÅ™ je rostliny a mÅ™te Å©Ž Barryho Faktor kolem 6%, polibte vaÅ™ je rostliny na rozlouÅ™enou. To nenÅ™- dostatek svÅ™tla ani pÅ™mi poÅ™izovÅ™nÅ™- zÅ™bÅ™ru s dlouhou expozicÅ™.

Page citations: Rice,
B.A. 2006a; personal observation.

Revised: January 2007

Å©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner