

O vzdušně vlhkosti.

Příspěvek původem Radek Kastner
 [30.06.2008]
 Aktualizováno [30.06.2008]

O: Vzdušnina masožravých rostlin vyžaduje podmínky vysoké vzdušné vlhkosti. Vitrána může poskytovat 50-90% vzdušní nou vlhkost, kterou vzdušnina masožravých rostlin vyžaduje.

Ibicella lutea a *Drosera binata*

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

Ale vzhledem k tomu, že vzdušnina masožravých rostlin vyžaduje cirkulaci/pohyb vzduchu, nedoporučují vám, abyste terárium neprodýjali uzávěrky. Pohyb vzduchu je znán dležitý například pro tužnice z USA, zatímco Iberický krovkám nevadí ani zcela uzavřená teráuria.

Pinguicula 'Pirouette' a *Drosera prolifera*

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

Následkem vitrány a teráuria nepoužívají, můsto toho používají jako podmisky velké třídy, které naplní vodou nebo obřízky a vodou. Tento způsob o kousání efektivně. Nejlepší je způsobem, jak vlhkost zvýšit tam, kde jsou listy (což je můsto, kde se to pořádá), je použít kus průhledného plastiku (například igelitový sáček) jako ochrany na rostlinu. Pokud žijete ve vlhkých oblastech, nebudete to pravidelně potřebovat. Ovšem pokud žijete v oblastech, kde je sucho, zvýšení vzdušné vlhkosti může být dležitým rozhodnutím.

Pokud nic jiného, zkuste použít alespoň terárium z lahve, abyste zvýšili vzdušní nou vlhkost kolem vašeho rostliny.

Page citations: Rice, B.A. 2006a; personal observation.

Revised: January 2007

Â©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner