

# Heliamphora macdonaldae – zapomenutá heliamfora

Příspěvek původně Radek Kastner

[12.10.2008]

Aktualizováno [03.02.2009]

```
@font-face {
    font-family: SimSun;
}
@font-face {
    font-family: Cambria Math;
}
@font-face {
    font-family: @SimSun;
}
@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin: 35.4pt; mso-footer-margin: 35.4pt; mso-paper-source: 0; }
.P.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
.LI.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
.DIV.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
.MsoChpDefault {
    FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-type: export-only; mso-default-props: yes; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt
}
.DIV.Section1 {
    page: Section1
}
}Začátek 20. století představuje období objevů a zkoumání – ažas, kdy obráz naší planety zástříval nekompletní stále zástříval plně neznámého. Guyanská vysokina ve Venezuele, severní Brazílie a Guyana, ležící v poprvé badatelé odlehčily země, které vodní obrovská pás-skovcová náhorní plošiny, z nichž pouze několik se prozkoumat nebo pojmenovat.
```

@font-face {

```

font-family: SimSun;
}
@font-face {
font-family: Cambria Math;
}
@font-face {
font-family: @SimSun;
}
@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin: 35.4pt; mso-footer-margin: 35.4pt; mso-paper-source: 0; }
P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
.MsoChpDefault {
FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-type: export-only; mso-default-props: yes; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt
}
DIV.Section1 {
page: Section1
}ObrovskÃ© srdce stolovÃ© hory Mount Roraima

```

FotoÂ©Stewart McPherson

```

v\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
o\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
w\:* {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}
.shape {
BEHAVIOR: url(#default#VML)
}

```

```

@font-face {
font-family: SimSun;
}
@font-face {

```

```

font-family: Cambria Math;
}
@font-face {
font-family: @SimSun;
}
@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin: 35.4pt; mso-
footer-margin: 35.4pt; mso-paper-source: 0; }
P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:
SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-
language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:
SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-
language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:
SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-
language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
PRE {
FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Courier New"; mso-fareast-font-family: "Courier New"; mso-
pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-GB; mso-style-
link: "FormÄjtovanÄ½ v HTML Char"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"
}
SPAN.FormtovanvHTMLChar {
FONT-FAMILY: "Courier New"; mso-fareast-font-family: "Courier New"; mso-style-unhide: no; mso-fareast-language: EN-
US; mso-ansi-language: EN-GB; mso-style-link: "FormÄjtovanÄ½ v HTML"; mso-style-name: "FormÄjtovanÄ½ v HTML
Char"; mso-style-locked: yes; mso-ascii-font-family: "Courier New"; mso-hansi-font-family: "Courier New"
}
.MsoChpDefault {
FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-type: export-only; mso-default-props: yes; mso-ansi-font-
size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt
}
DIV.Section1 {
page: Section1
}Dokonce i ve chvÃli, kdy vÂ EvropÄ zuÅmila II. svÄtovÃj vÃlka, nebyl jeÅjtÄ ani objeven gigantickÃ½ horskÃ½ hÅtmeben M
kterÃ½ se tyÅ-Ä do vÃ½Åje pÅtmes tÅtm i kilometry. GuyanskÃj vysokÃina zÅstÃvala nepopsanÃ½m mÃstem na mapÄ. Â v
1928 zapoÅali americkÃ½ botanik Henry Gleason a jeho kolegovÃ© impozantnÃ- cestu do odlehlÃ© provincie, aby
prozkoumali mÄjlo znÃjmÃ½ vrchol zvanÃ½ Cerro Duida, kterÃ½ leÅ¾Ã- vÂ srdci venezuelskÃ© Amazonie, stovky kilometrÃ-
Caracasu a od vÅjech nadÄjÄ- na zÃjchranu. PÅtm edtÃ-m byla hora navÅjtÃ-vena pouze hrstkou nÃj hodnÃ½ch nÃjvÅjtÃvnÃ
jejÄ- vrchol zÅstal neprozkoumÃjn a neznÃjmÃ½. Â PÅtmekÅjÅ¾ky nÃjvÅjtÃvy tohoto izolovanÃ©ho koutu jiÅ¾nÃ Ameriky
skuteÄnosti podobnÃ©, jako je tomu stÃje i dnes Å povodÃ- Åtmeky Orinoko a jeho pÅtmÃ-tokÅ- je pÅtm eruÅjovÅjno peÅtm
prudkÃ½mi vodopÅdy, silnÃ½mi proudy a skalnatÃ½mi mÄjliÄinami a zemÄ- postrÃjdÄ cesty jakÃ©hokoliv typu Å strmÃ© h
hlubokÃj Ä°dolÃ- a prÅrvy, dÄlajÄ- cestovÃjnÃ- extrÃ©mnÃ- nÃjroÅnÃ½m. VÂ takto odlehlÃ½ch mÄstech musÃ- bÄ½t veÅj
vybavenÃ- a zÃjsoby neseny sebou Å vÄtÅjinou lidmi Å jmenovitÃ- mÃstnÃ-mi indiÃny. Â Gleasonova expedice zapoÅala
na Älunech, avÅjak jakmile se ÅtmÄ-ÄnÃ- tok zmenÅjl do podoby mÄlkÃ½ch ÅtmÄ-Äek a nakonec se stal nesplavnÃ½, exp
vyrazila pÅjky a zapoÅala tak tÅzdny nÃjroÅnÃ©ho pochodu hustou, temnou guyanskou dÅ¾unglÃ-. Po tÅzdnech usilovn
putovÃjnÃ- se objevila Cerro Duida na dohled, ale na rozdÃl od bÄ¾nÃ© hory, tato byla obkrouÅ¾ena na vÅjech stranÃjch t
kolmÃ½mi skalnÃ-mi stÃnami a tak byl Gleason pÅtincen nalÅzit nÄjakou prÅrvu ve skalnÃ- stÃnÃ- a eventuÅlnÄ- tak
dosÅhnout vrcholu tÅto tajemnÃ© nÃjhornÃ- ploÅiny. Â Po dosaÅ¾enÃ- cÅle svÃ© cesty posbÃral a uchoval Gleason ex
velkÃ©ho mnoÅ¾stvÃ- novÃ½ch rostlinnÃ½ch a Å¾ivoÅjÅnÃ½ch druhÅ-, kterÃ© ho na vrcholu hory obklopovaly Å druhÅ-, nikdo pÅtm ed tÅ-m nevidÃl. Mezi mnoÅ¾stvÃ- novÃ½ch rostlinnÃ½ch a Å¾ivoÅjÅnÃ½ch objevÃ- byly tÅtm i zajÄ-mavÃ© masoÅ¾ravÃ© rostlinky, kterÃ© pojmenovÃjny Heliamphora tatei, Â Heliamphora tyleri a Heliamphora macdonaldae. Â Heliamphora tatei je pravdÄ-podobnÃ, nejpozoruhodnÄjÄ- â je unikÄtnÃ- a obvykle roste na vysokÃ½ch dÅtm evnatÃ½ch stoncÃ-ch, dlouhÃ½ch aÅ¾ dva metry. naplnÄ- masoÅ¾ravÃ© listy vytvÃjÅtmÄ- kompaktnÃ- rÅ-Å¾ici na vrcholu vysokÃ©ho stonku a tak ÄnÃ- nÃjpadnÄ- nad ok
kÅtovinatou vegetacÃ-. Listy H. tateijsou velkÃ©, (aÅ¾ 25 - 35 cm dlouhÃ), nÃjlevkovitÃ- a jasnÃ- zbarvenÃ© (pÅtm evlÃjdÃ zelenÃj sÅ variabilnÃ-m Å-ervenÃ½m vybarvenÃ-m). VnitÅtmek listÅ- (lÅjÄ-ek) je pokryt Åtmadami krÃjtkÃ½ch, dolÅ- smÅ-Åtm chlupÅ-, i kdyÅ¾ u nÄjterÃ½ch jedincÅ- se tÅjhne vnitÅtm nÃ- zadnÃ- Ä-ÄjstÃ- smÅrem dolÅ- holÃ½ pÅjs. Â Heliamphora tyleri povaÅ¾uje za varietu H. tatei a dnes se nepovaÅ¾uje za platinÃ½ samostatnÃ½ druh. JejÄ- listy jsou do znaÅnÃ©ho mÄry stejne jako ty u H. tatei Å jedinÃ½m patrnÃ½m rozdÃlem se jevÃ- tvar ÅžnektarovÃ©ho vÃ½bÄÅ¾kuâ€œ Å je to nektar obsahuje. I kdyÅ¾ se zdÃj, Å¾e rostlina pojmenovanÃj Gleasonem jako H. tyleri, se liÅjÄ- od H. tatei tÅ-m, Å¾e obvykle neroste na vztÅtmÄ-menÃ©m stonku, byly objeveny dalÅjÄ- variety H. tatei na okolnÃ-ch horÃjch (zvlÅjÅjtÅ- potom na Cerro Avispa a Cerro

```

Aracamuni), který sbližuje a naznačuje rozdíly a rostlina když pojmenovaná H. tyleri je vlastně pátý rodu druhu H. tatei. Situace kolem této rostliny je nízko na Cerro Duida odlišná od heliamfor pojmenovaných Gleasonem jako H. tatei a H. tyleri. H. macdonaldae roste jako kompaktní růžnice na zemi, stejně jako další druhy heliamfor, vyjma H. tatei. Pátý rostliny je vzdáleně odlišná od onoho vzpřímeného, dívavého, který má ve zvyku vytvářet listy. Mimoto jsou také listy H. macdonaldae jedinečné svou morfologií (stavbou) a zbarvením. Vnitřní strana listů je holá, vyjma žlutých linky, které vypadají jako chlupy, které lemují obvod otvoru květy. Nektarový výběh je kuželovitý, ale zadní - výběh prodloužený, jako je tomu u H. tatei a možná i u nejvíce podobného H. tatei. Ze výběhu je interiér listu, který je protkán proměnlivou žebrovou, žláznou nebo purpurovou žilatinou, která se přesouvá na zadní stranu listu a karmínovým květem. Který je jedinečný v celém rodu. Vnitřní strana listů je shodná s žlutavou zelenou a nektarovým výběhem žlutým.

Vlevo a vpravo mimo známou, ale velmi krásnou Heliamphora macdonaldae

Foto: Stewart McPherson

```

@font-face {
    font-family: SimSun;
}
@font-face {
    font-family: Cambria Math;
}
@font-face {
    font-family: @SimSun;
}
@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin: 35.4pt; mso-footer-margin: 35.4pt; mso-paper-source: 0; }
P.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
LI.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
DIV.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
A:link {
    COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-unhide: no; text-decoration: single
}
SPAN.MsoHyperlink {
    COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-unhide: no; text-decoration: single
}
A:visited {

```

```

COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99; text-underline: single; mso-style-noshow: yes;
mso-themecolor: followedhyperlink
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99; text-underline: single; mso-style-noshow: yes;
mso-themecolor: followedhyperlink
}
PRE {
FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Courier New"; mso-fareast-font-family: "Courier New"; mso-
pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-GB; mso-style-
link: "FormÃ¡tovanÃ½ v HTML Char"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"
}
SPAN.FormtovanvHTMLChar {
FONT-FAMILY: "Courier New"; mso-fareast-font-family: "Courier New"; mso-style-unhide: no; mso-fareast-language: EN-
US; mso-ansi-language: EN-GB; mso-style-link: "FormÃ¡tovanÃ½ v HTML"; mso-style-name: "FormÃ¡tovanÃ½ v HTML
Char"; mso-style-locked: yes; mso-ascii-font-family: "Courier New"; mso-hansi-font-family: "Courier New"
}
.MsoChpDefault {
FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-type: export-only; mso-default-props: yes; mso-ansi-font-
size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt
}
DIV.Section1 {
page: Section1
}

```

V roce 1978 se Magure rozhodl redukovat *H. macdonaldae* na varietu *H. tatei* (*H. tatei* var. *macdonaldae*) a o Å¡est let pozdÅ›ji ji Steyermark pÅ™ejmenoval na pouhou formu tohoto druhu (*H. tatei* f. *macdonaldae*). Jakmile byly uÄ•inÄ›ny tyto taxonomickÂ© zmÄ›ny, rostlina zmizela zÂ literatury a zmiÅ›ovalo ji pouze nÄ›kolik mÄ›jlo zdrojÅ .

```

@font-face {
font-family: Cambria Math;
}
@font-face {
font-family: @SimSun;
}
@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin: 35.4pt; mso-
footer-margin: 35.4pt; mso-paper-source: 0; }
UNKNOWN {
FONT-FAMILY: SimSun; panose-1: 2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt: á®ä½“; mso-font-charset: 134; mso-generic-font-family:
auto; mso-font-pitch: variable; mso-font-signature: 3 680460288 22 0 262145 0
}
P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family:
SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-
language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family:
SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-
language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family:
SimSun; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-style-qformat: yes; mso-fareast-
language: ZH-CN; mso-ansi-language: EN-US
}
A:link {
COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-unhide: no; text-underline: single
}
```

```

}

SPAN.MsoHyperlink {
COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-unhide: no; text-underline: single
}
A:visited {
COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99; text-underline: single; mso-style-noshow: yes;
mso-themecolor: followedhyperlink
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline; mso-style-priority: 99; text-underline: single; mso-style-noshow: yes;
mso-themecolor: followedhyperlink
}
PRE {
FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Courier New"; mso-fareast-font-family: "Courier New"; mso-pagination: widow-orphan; mso-style-unhide: no; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-GB; mso-style-link: "FormÄjtovanÄ½ v HTML Char"; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"
}
SPAN.FormtovanvHTMLChar {
FONT-FAMILY: "Courier New"; mso-fareast-font-family: "Courier New"; mso-style-unhide: no; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-GB; mso-style-link: "FormÄjtovanÄ½ v HTML"; mso-style-name: "FormÄjtovanÄ½ v HTML Char"; mso-style-locked: yes; mso-ascii-font-family: "Courier New"; mso-hansi-font-family: "Courier New"
}
.MsoChpDefault {
FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-style-type: export-only; mso-default-props: yes; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt
}
DIV.Section1 {
page: Section1
}

```

ZdÄj se, Ä¾e se nikdo na Cerro Duida nevrÄjtil a nepozoroval *H. macdonaldae* v pÅ™Ä-rodÄ› a tak byl tento taxonomickÄ½ sestup pÅ™ijat a bylo pÅ™edpoklÄjdÄjno, Ä¾e rostlina je pouhÄ½m synonymem *H. tatei*. Navzdory GleasonovÄ™m zjiÅjtÄ>nÄ-tato pozoruhodnÄj heliamfor stala mÄjlo znÄjmou a do znaÄ•nÄ© mÄ-ry neznÄjmou.

*H. macdonaldae* je vÄjak jedineÄ•nou a zasluhuje si status samostatnÄ©ho druhu, kterÄ© jÄ- Gleason pÅ™vodnÄ› udÄ›il. NÄjrovnatÄ© morfologie a zbarvenÄ- tÄ©to pozoruhodnÄ© rostliny jsou odliÄjnÄ© od ostatnÄ-ch druhÅ- rodu *Heliamphora*. PÅ™estoÄ¾e se *H. macdonaldae* neobjevuje v kultivaci, doufÄjm, Ä¾e tomu tak jednou bude, takÄ¾e si jÄ- budou moci uÄ¾vat a obdivovat pÄstiteleÄ© a nadÄjenci do masoÄ¾ravek na celÄ©m svÄ›tÄ!

NovÄj kniha Stewarta McPhersona âžPitcher Plants of the Americasâœ zkoumÄj pÅ™Ä-rodnÄ- nÄjroky a pozoruhodnou rozmanitost vÄjech znÄjmÄ½ch americkÄ½ch rostlin sÄ lÄjÄ•kami, vÄ•etnÄ› *H. macdonaldae*. Stewart prodÄjvÄj vÄ½tisky osobnÄ© pÅ™es svou internetovou spoleÄ•nost [www.redfernnaturalhistory.com](http://www.redfernnaturalhistory.com), aby zÄ-skal penÄ-ze pro Meadowview Biological Station â€“ jejÄ-mÄ¾ cÄ-lem je vÄnovat 5 aÄ¾ 10 akrÅ- Ä¾ivotnÄ-ho prostÅ™edÄ- Äjpirlic kÄ trvalÄ© ochranÄ>. PodÄ-vejte se na strÄjny [www.redfernnaturalhistory.com/conservation.htm](http://www.redfernnaturalhistory.com/conservation.htm).

Seznam pouÄ¾itÄ© literatury

Gleason, H. A. 1931. âœBotanical results of the Tyler-Duida Expedition.â• Bulletin of the Torrey Botanical Club 58 (6): 367â€“368.

Maguire, B. 1978. âœSarraceniaceae.â• Memoirs of the New York Botanical Garden 29: 36â€“62.

Steyermark, J. A., 1984. âœFlora of the Venezuelan Guayanaâ• Annual of the Missouri Botanical Garden 71: 297â€“340.

Â© Stewart McPherson

T: Radek Kastner