

Utricularia: bublinatky

PÄ™-spÅ›ek pÄ™idal Radek Kastner

[05.05.2009]

AktualizovÁno [06.05.2009]

O: VÁ-teje u bubletek, nejvÄ›tÅ›iho rodu masoÅ›ravÅ›ch rostlin, s vÄ›ce neÅ¾ 220 druhy, kterÁ se vyskytuje po celém svÄ›tě. LatinskÁ jmÄ›no rodu odkazuje k tomu faktu, Å¾e jsou rostliny Åžozdobeny Åœe vÄ›jký, nebo malÅ›mi, jako batoh vypadající-mi mÄ›chÅ›ky (Åžubulinami Åœe), velkÁ pouhÅ›ch nÄ›kolik mm. Ty zÄ™ejmÄ› takÁ daly rostlinám jejich obecnÁ jmÄ›no. Tyto malÁ mÄ›chÅ›ky jsou masoÅ›ravÅ›mi pastmi jakÅ›ch druhÅ›ch nenajdete a garantují vÄ›jm, Å¾e nad nimi uÅ¾asnete!

Utricularia cornuta a Utricularia intermedia

Foto Galleria Carnivora Å©Barry Rice

Rod Utricularia je znÁjm

mnoho dlouhÅ›ch let; v roce 1753 Linnaeus zmÄ›nil sedm druhÅ› (U. bifida, U. caerulea, U. foliosa, U. gibba, U. minor, U. subulata a U. vulgaris). I kdyÅ¾ smysl jejich zvlÁtnosti mÄ›chÅ›ky, kterÁ jsou vytvářeny pod zemÄ›- nebo pod vodnÄ›- hladinou, byl dlouhou dobu Å›patnÄ› vykládán a to jako plovací- mechanismus (vÄ›tÄjina znÁjmÅ›ch pestrobarevnÅ›ch druhÅ› byla vodnÄ›- ch). Ale v roce 1876 vÄ›dkyně jmÄ›nem Mary Treat zjistila, Å¾e jsou mÄ›chÅ›ky vlastnÄ› podtlakovÅ›mi pastmi; pozdÄ›ji Darwin a Lloyd uskutečnili vÄ›ce pokusÅ› a označili rod jako masoÅ›ravÅ›. Rozhodující-m podkladem pro naše pochopení- tohoto rodu byla publikace Petera Taylora, kterÁ vytvořil velkou monografii rodu. Podivuhodnou kombinaci technické expertnosti, nadáně- a lásky, tato práce je ohromující- a vÄ›c.

V Taylorově monografii byl rod rozdelen do dvou podrodÅ› a 35 sekčí-. Nejnovější- práce naznačuje, Å¾e nejlepší- a mzpÅšobem, jak tento rod rozložit jsou tří- podrody a 33 sekčí-. Jak nejvíce naložit rodovÅ›mi poddivizemi je všechno jen ne transparentní- a jsem si jist, Å¾e mnoho z Á vás nebude souhlasit s Á pÅ™-stupem, kterÁ jsem mÄ›l. Pokud nesouhlasí- te, prosím dokažte mi to

vÂ publikovanÃ© literatuÅ™e! Budu Å¡Å¥asten, kdyÅ¾ budu moci zahrnout dalÅ¡iÅ¬ vylepÅjenÅ¬ zaloÅ¾enÅ¬ na citovanÃ©m vÅ½zkumu.

Utricularia uniflora a Utricularia macrorhiza

Foto Galleria CarnivoraÂ©Barry Rice

Rod Utricularia obsazuje jakÃ©koliv pÅ™edstavitelnÃ© prostÅ™edÅ¬, kde se stÃ¡vÃ¡jí masoÅ¾ravost vÅ½hodou. Druhy se vyskytujÃ¬ na vÅ¡ech kontinentech vyjma Antarktidy. V USA se vyskytujÃ¬ ve vÅ¡ech stÅ¡tech, vÂ KanadÄ› vÂ kaÅ¾dÃ© provincii; v AustrÃ¡lii jsou tak bÄ›Å¾nÃ©, Å¾e jedÅ¬ dÄ›ti. (OK, vynete tu poslednÃ¬ Ä•st.) Druhy osÃ¬dly mnohÃ¡ prostÅ™edÅ¬, vÄ•etnÄ› vodou nasÃ¡chlÄ›ch pÅ™d, jezer, vodnÃ¬ch tokÅ¬, povrchÅ¬ a puklinstromÅ¬ a bromÄ©liÅ¬ a sezÅ¾nnÄ› vlhkÅ½ch pouÅ¡tÅ¬! JedinÅ½m prostÅ™edÅ¬m, kterÃ© jimi jeÅ¡tÄ› nebylo vyuÅ¾ito, je silnÄ› brakickÃ© (poloslanÃ©) aÅ¾ moÅ™skÃ© prostÅ™edÅ¬. (I kdyÅ¾ Utricularia benjaminiana dokÃ¡Å¾e pÅ™eÅ¾Ã¬t vÂ nÄ›kterÅ½ch stÅ™ednÄ› brakickÅ½ch vodÅ¡ch.)

KvÄ›ty bublinatek jsou obvykle malÃ©, ale vytvÃ¡jÃ™ejÃ¬ pÅ™i svÃ© velikosti divokou Å¡kálu barev a tvarÅ¬. Existuje mnoho druhÅ¬, takÅ¾e ti, kdo je studujÃ¬, musÃ¬ obezÅ™etnÄ› pouÅ¾Ã¬vat botanickou terminologii kÅ popisu kvÄ›tÅ¬. Abyste dokÃ¡zali sprÃ¡vnÄ› identifikovat jednotlivÃ© druhy, musÃ¬te se nauÄ›it mnoÅ¾stvÃ© opatrnosti definovanÅ½ch botanickÅ½ch vÅ½razÅ¬.

NadzemnÃ¬ Ä•sti pozemnÃ¬ch druhÅ¬ jsou Ä•asto malÃ© a nenÃ¡padnÃ©; listy mohou vypadat jako traviny, mohou bÄ½t ovÃ¡lnÃ©, Ä•irkovitÃ© nebo podlouhlÃ©. ZatÃ-mco masoÅ¾ravÃ© mÄ›chÃ½Å™ky jsou nejkomplikovanÃ©jÅ¡iÅ¬ a nejvychytralejÅ¡iÅ¬ mezi vÅ¡emi masoÅ¾ravÅ½mi rostlinami a dozajista jsou jednÃ¬m zÅ divÅ¬ botanickÅ©ho svÄ›ta!

MasoÅ¾ravÃ© procesy probÃ¡hajÃ¬ pod vodnÃ¬ hladinou neboÅ vÂ podzemÃ¬, ve vodou nasÃ¡klÃ©m substrÃ¡tu. MÄ›chÃ½Å™ky se pÅ™ipravÃ¬ samy vypumpovÃ¡nÃ¬m tekutiny ze svÃ©ho nitra, pÅ™es speciÃ¡lnÃ¬ dvojklanÃ© a Ä•tyÅ™eklanÃ© Å¾ilÃ¡zy. VÅ½sledkem je, Å¾e tlak vody uvnitÅ™ mÄ›chÃ½Å™ku je niÅ¾Å¡iÅ¬ neÅ¾ tlak vody, kterÃ¡ jej obklopuje. MÄ›chÃ½Å™ek mÃ¡ padacÃ¬ dveÅ™e, ale ty jsou pevnÄ› uzavÅ™eny pomocÃ© kombinace prahovÅ©ho hÅ™ebene na vstupu do mÄ›chÃ½Å™ku a slizu, jako dodateÄ•nÅ©ho tÅ›nicÃ©ho prostÅ™edku. MalÃ© organismy narazÃ¬ na vstup do pasti (nenÃ¬ znÃ¡mo, zda tyto organismy se jen potulujÃ¬ bezcÃ¬lnÄ› kolem nebo jsou nÄ›jak nebo nÄ›Å•m ke vstupu pasti pÅ™itahovÃ¡ny).

BuÄ• nÅ¡razÃ¬ do vlastnÃ¬ho vstupu do pasti nebo se snad dotknou malÅ½ch, jako chlupy vypadajÃ©cÃ¬ch orgÃ¡nÅ¬ trÄ•cÄ•ch pÅ™ed vchodem do pasti. Nebo chlupy prostÅ›e podrÅ¾enÃ© jako pÅ¡kky pootovÅ™enÃ© dveÅ™e do mÄ›chÃ½Å™ku (snad sÅ nÄ›jakou mechanickou vÅ½hodou jako vchodovÃ© chlupy), nebo prostÅ›e dveÅ™e nÄ›jak mÄ•rnÄ› povolÃ¬ dÃ-ky

nějakému aktivnímu procesu (možná něj podobnemu změnám vnitřního napětí - buňky, která je patrná v pánvi světlu rostlin rodu Mimosa, nebo podobnému procesu, který se vyskytuje u mucholapek - Dionaea?). Vzhledem k tomu, že je tlak v pastech je nízká, voda vtrhne do pasti a malé organismy tam splachne s sebou. Kožník nemá žanci kůžičky, vzhledem k tomu, že je do pasti vrátěna za krátkou dobu, než je 1/30 sekundy. Dveře pasti se otevřou uzavřou, uvíznou takžeivojichy uvnitř.

Foto Galleria Carnivora ©Barry Rice

Máčeky vytvářejí trávicí enzymy a strávějí se i sám. Vzhledem k velikosti kožníku to zabere několik hodin až dny, než je kožník stráven. Velmi velký kožník, jako například Červi, který není zcela kompletně polapen, mážádlo být tráven po velmi dlouhou časovou periodu, vzhledem k tomu, že máček tráví kožník postupně po částech, nejdříve tu žest, který je uvnitř máčku a následně další žest, která jsou postupně pomalu do pasti vtahovány a rozpuštěny, vaje vše dobře, když mážádlo být kožník stále živý. No tak tohle je fakt dost strašné?

Page citations:

Darwin, C. 1875; Lloyd, F.E. 1942; Müller, K., and Borsch, T. 2005; Rice, B.A. 2006a; Schlauer, J. 2002; Taylor, P. 1989; personal observations.

Revised: January 2009

©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner