



tridactyla a U.  
warburgii.

Prostředně-velký bublinek na Novém Zélandu

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

2) Podle Taylora: je dalších osm druhů bublinek známých jen z jejich originálního sběru. A znovu není jasné, zda jde o tak vzácné rostliny, nebo jsou to druhy prostě málo sbírané: U. cheiranthos, U. deterrmannii, U. garrettii, U. hintoii, U. kenneallyi, U. mirabilis, U. peranomala a U. rhododactylos.

3) Utricularia podadena byla sbírána pouze dvakrát na lokalitě, která byla zničená zemětřivkami, takže je pravděpodobně vyhubena.

4) Japonská U. dimorphantha je extrémně ohrožená v pěstování prostředně-.

Lokalita s bublinkami v Britské Kolumbii

Foto Galleria Carnivora © Barry Rice

5) Některé vodní druhy, jako například U. stygia, jsou v Evropě extrémně vzácné a mnoho jejich přivodních lokalit bylo již zničeno.

6) Utricularia amethystina je zřejmě vyhubena v USA, i když stále existuje populace ve střední Americe.

Page  
citations: Rice, B.A. 2003c, 2006a; Taylor, P. 1989; personal observations.

Revised: July 2007

©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner