

Rozšíření rodu *Philcoxia* a status ochrany

Přispěvek páně Radek Kastner
[05.09.2012]
Aktualizováno [05.09.2012]

Tyto druhy rostou v různých
částech Brazílie v horských savanách a pustinných oblastech.

•

Philcoxia minensis

Philcoxia

bahiensis: Vyskytuje se poblíž Piatã, ve státě Bahia, v pohoří Serra do Atalho, v hluboké části horských savan. Tato rostlina byla pozorována jak roste v rozsáhlých, téměř jednodruhových staniích - sádkách hald, které souvisí s diamantovými doly.

Philcoxia minensis

Philcoxia goiasensis: Známá pouze z typové lokality ve státě Goiás, z hluboké části páně v pustinné oblasti. Nebyla spatřena od doby svého nalezení a sběru v roce 1966.

Philcoxia minensis

Philcoxia minensis: Vyskytuje se v pohoří Serra do Cabral, ve státě Minas Gerais a to jak v oblastech narušených dálnicemi - těžbou, tak na ložiscích báňského páně.

•

Philcoxia minensis

O rozšíření rodu - taktéž druh - je známo opravdu velmi málo. I když se obecně předpokládá, že se všechny druhy vyskytují ve velmi malých oblastech a tím pádem se jedná o jejich potenciální ohrožení. *Philcoxia bahiensis* se u nás na své typové lokalitě nevyskytuje, vzhledem k tomu, že zde došlo k mnoha změnám způsobeným lidskou činností (zvláště potom vytvořením plantáží a využitím prostoru pro pastvu). Těžba páně a budování silnic jsou dalšími důvody pro obavy. Na druhou stranu byly tyto rostliny pozorovány jak pronikají do lokalit, které byly opuštěny po dolování. Tyto oblasti mohou být ruční ruderalními (rumičními) znaky, z nichž mohou

rostliny prospívají ve chvíli, kdy jde o antropogenní (lidskou činnost) změny; stanoviště.

Ā

Philcoxia minensis Ā

Page citations: Ā Fritsch, P.W., Ā et al. 2007; Pereira, C.G. and Oliveira, R.S. 2010; Taylor, P., Ā et al. 2000. Ā

Revised: January 2012

Ā©Barry Rice, 2005

Photo: Ā <http://wuwei1101.popo.blog.163.com/blog/static/4867086720126324757920/> Ā

T: Radek Kastner Ā