

## Kde se vyskytují rosnatky?

Přátelství spolek přátel Radek Kastner  
[30.12.2007]  
Aktualizováno [11.03.2008]

?: Kde se vyskytují rosnatky?

O: V USA a Kanadě se vyskytuje kolem sedmi druhů rosnatek, z číle ¾ na tom, které z nich akceptujete jako samostatné druhy.

Většinou seznam druhů vyskytujících se v USA a Kanadě obsahuje následující druhy:

- *D. anglica*

Foto Copyright © Jan Fialšek

- *D. brevifolia*

Foto Copyright © Jan Fialšek

- *D. capillaris*

*Drosera capillaris*; lokalita *D. capillaris*, Mississippi

1) Foto Copyright © Jan Fialšek 2) Foto *Galleria Carnivora* © Barry Rice

- *D. filiformis*

D. filiformis var. filiformis; D. filiformis var. tracyi

Foto Copyright © Jan FIŠek

- D. intermedia

Drosera intermedia a její- lokalita v Massachusetts

1) Foto Copyright © Jan FIŠek 2) Foto Galleria Carnivora©Barry Rice

- D. linearis

lokalita Drosera linearis

Foto Galleria Carnivora©Barry Rice

- D. rotundifolia

Drosera rotundifolia a její- lokalita v Kalifornii

1) Foto Copyright © Jan FIŠek 2) Foto Galleria Carnivora©Barry Rice

mapy rozšíření rodu *Drosera* v USA

(vysvětlivky k mapám naleznete v textu)

Foto *Galleria Carnivora* © Barry Rice

Už jen přidání *Drosera filiformis* do tohoto seznamu způsobuje určitě komplikace. Zprvu: existují dvě dobré varianty tohoto druhu. *Drosera filiformis* var. *filiformis* je menší, je hluboce zabarvená do červené a vyskytuje se v Severní (Jižní?) Karolině, severně do Massachusetts (Nova Scotia). *Drosera filiformis* var. *tracyi* je větší, bledě zelená vyskytuje se na pobřeží Mexického zálivu a po Floridu a jihovýchodně Georgii.

Některé botanické práce považují *D. filiformis* var. *tracyi* za samostatný druh (čD. *tracyi*), ale toto jméno nelze publikováno (je to čD. nudem). Obě varianty mají tak velmi podobná semena a ochotně tvoří hybridy, které schopny dalšího rozmnožování, což není případ u dalších severoamerických rosnatek.

Ke většímu zmatku v rozšíření *D. filiformis* existuje několik malých populací tohoto druhu na Floridě, které jsou červené. Není jasné, zda se jedná u těchto odlišných populací o *D. filiformis* var. *filiformis* nebo o červenou *D. filiformis* var. *tracyi*.

Děle se můžete setkat se jmény "D. annua" a "D. leucantha", které odkazují k různě kvetoucím verzím *D. brevifolia*. Souasně není zřejmé, zda se jedná o dvě jména si nezasloužící status samostatných druhů.

No a konečně něco podivného se děje také s populacemi *D. intermedia* a *D. capillaris*, speciálně na pobřeží Mexického zálivu a dále na poloostrově Florida. V těchto oblastech se můžete setkat s čD. dlouhohlolistou *D. capillaris*, která vypadá odlišně od *D. capillaris* rostoucích děle ve vnitrozemí. Mnoho lidí se domnívá, že se jedná o populace hybridů, polyploidů nebo něčeho podobného. Začínám se zabývat kacátskou myšlenkou, že zde existují nějaké druhy populace, které nebyly správně identifikovány, ale nestrávil jsem dostatečně mnoho času zkoumáním lokality, byl schopen vynést nějaké závěry o stanovisko. Některé mávahy na toto téma si můžete přečíst v do Louisiany a Mississippi v roce 2005.

Jen tak mimochodem, nepovažujte uvedenou mapu za přesnou a vyberpávejte, co se rozšíření rosnatek týká diskuse zoběhne rozšíření. Některé lokality a prostě také přidání k její nepřesnosti. Hlavně myšlenkami k přeměně oblasti, kde by se spíše rosnatky vyskytovat mohly.

Pro kompletnost pro oběany USA bych měl doplnit ještě mapy Aljašky a Havaje. Na Havaji se vyskytuje *D. anglica*, která byla nalezena v bažinách Alaika'i na hoře Kaua'i.

Page citations: D'Amato, P. 2001 (personal communication); Rice, B.A. 2006a; Schnell, D.E. 1976, 1999b, 2002a; Snyder, I. 2002 (personal communication); personal observation.

Revised: January 2007

©Barry Rice, 2005

T: Radek Kastner

V České republice se vyskytují následující rosnatky:

-

*Drosera anglica* - kriticky ohrožený druh, Krušnohory, Á umava, Krkonoše, Těbošsko

*Drosera anglica* (FOTO © Jan Fišer)

-

*Drosera intermedia* - kriticky ohrožený druh, Českolipsko, Český les, Krkonoše, Těbošsko

*Drosera intermedia* (FOTO © Zdeněk Aksamit)

*Drosera — obovata* (křídlenec *D. anglica* a *D. rotundifolia*)

*Drosera — obovata* (FOTO © Jan Fišer)

-  
Drosera rotundifolia - silnĚ ohroženĚ druh, naĤ je nejrozĤĚnĚjší rosnatka, JesenĚ-ky, Beskydy, Ĥ umava, Krkonice, JizerskĚ, KruĤnĚ a OrlickĚ hory, Brdy, jiĤnĚ Ĥechy, ĤeskomoravskĚ vrchovina

Drosera rotundifolia (FOTO Ĥ Radek Kastner)

Ve SlovenskĚ republice se vyskytujĚ nĚsledujĚcí rosnatky:

-  
Drosera anglica

-  
Drosera rotundifolia

(pozn. pĤĚkl.)