

STRATIFIKACE

Přetmá-spávek přetmidal Radek Kastner
[13.01.2008]
Aktualizováno [21.06.2008]

Přvod termá-nu stratifikace musá-me hledat v latinském stratum = vrstva, facere = Āinit. Āesky tedy v podstatě rozvrstveně. Z pohledu masožravých rostlin označujeme za stratifikaci proces, kterým ujednotíme āasově jinak rozvrženě klā-āeně semen do jednoho období. Ke stratifikaci se využívá nějaký postup. Chladová stratifikace je období cca 6 týdnů vystaveně chladu, které se používá k nastartování klā-āeně semen některých zejména evropských, severoamerických a novozélandských druhů MR rodů Darlingtonia, Dionaea, Drosera, Pinguicula a Sarracenia.

U semen Byblis gigantea, některých australských Āi jihoafrických rosnatek je stratifikace naopak āāinek tepla āili tepelně stratifikace, doporučuje se přetelě-t je na sětku vaě-cě vodou a napodobit tak tepelně āāinek poěru, po semeny zapřlit zmačkaně papě-r, slěmu apod. Metod jak stratifikovat a odblokovat klā-āeně semen je celě āěda. Spolehlivou náhradou těchto někdy krkolomných metod je používě 0,1% roztoku kyseliny giberelové (GA3).