

Cephalotus: Rozšíření a stav ochrany

Přeshraniční spolupráce Radek Kastner

[13.01.2008]

Aktualizováno [28.06.2009]

?: Cephalotus: Rozšíření a stav ochrany

O: Cephalotus

se vyskytuje pouze v relativně malé oblasti kolem města Albany v jihozápadní Austrálii a to v pásu od Augusty po mys Riche.

Pokud v něm, neexistují momentálně ohrožené, které by významně devastovala populace Cephalotu v přirodě. Počáry, spásání porostu dobyt看 a (pravděpodobně) invazivní druhy tento efekt může mít, ale existují také chráněné populace, například v národním parku D'Entrecasteaux; zde musí rostliny pouze soupeřit s nepůvodními druhy, jako jsou divoké prasata, náčkáři a kočky. I když některé tyto důvody mohou ukazovat na to, proč se Cephalotus vyskytuje v tak malé oblasti a tím se dopad těchto ohrožených může zvelšovat.

Cephalotus a mnoho rostlin...

Foto *Galleria Carnivora* © Barry Rice

Jak může být dopad změny globálního klimatu, no tak to bych rád věděl.

Je pytlácký problém? Nemyslí si to. Na druhou stranu jsem zaznamenal, že Australané v této oblasti mají sklon chránit informace o pro ně nejzávažnějších oblastech v přírodě. Myslí si, že to je pouze reakce na to, že viděli některé lokality zdevastované.

Málo Cephalotus a opravdu mnoho rostlin na svahu

Foto *Galleria Carnivora* © Barry Rice

Pravděpodobnou důležitou podměnkou zachování dlouhodobého přetrvání těchto rostlin je pokračování přetrvání poškození v divočině. Cephalotus je dobře na oheň adaptován a je to jedna z prvních rostlin, které se objeví po chvli, kdy došlo k poškození. (Toto může být spojeno s dormantním chováním, které bývá tak protivně působit.) Potlačení poškození může být pro tuto rostlinu kritické, protože by to umožnilo jiným druhům obsadit území obývané Cephalotem a vytlačit jej.

Page citations:

Gibson, R. 1999, 2001; Hummer, J. 2000; Juniper, B.E., et al. 1989; Lowrie, A. 1998; Rice, B.A. 2006a; personal observations.

Revised:
January 2007

©Barry Rice, 2005