Teplota

PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Radek Kastner
[20.02.2008]
AktualizovÃ¡no [03.04.2009]

Teplota TeplotnÃ- poÅ¾adavky rÅ¯znÃ½ch masoÅ¾ravek se Å™Ã-dÃ- v prvnÃ- Å™adÄ› podle jejich pÅ™Ã-rodnÃ-ch stanoviÅ¡ mohou bÃ½t velmi rÅ¯znorodÃ© na zÃ¡kladÄ› Å¡irokÃ©ho vÃ½skytu v rozdÃ-lnÃ½ch klimatickÃ½ch oblastech. PÅ™estoÅ¾e j nÄ›kterÃ© druhy v tomto smÄ›ru tolerantnÃ-, dÃ¡ se Å™Ã-ci Å¾e platÃ-, co moÅ¾nÃ¡ nejvÃ-ce dodrÅ¾et minimÃ¡lnÄ› jejich pÅ V zÃ¡sadÄ› se dajÃ- tyto teplotnÃ- oblasti rozÄ•lenit do tÅ™Ã- hlavnÃ-ch skupin, ke kterÃ½m mohou bÃ½t pÅ™iÅ™azeny jedno druhy:

-

Oblasti mÃ-rnÃ©ho pÃ¡sma

Tyto oblasti se vyznaÄ•ujÃ- mÃ-rnÃ½m lÃ©tem s rozdÃ-ly mezi dennÃ-mi a noÄ•nÃ-mi teplotami, stejnÄ› jako i studenou zimou lehkÃ½mi mrazy. Sem se Å™adÃ- vÅ¡echny zimÄ› odolnÃ© masoÅ¾ravky, kterÃ© upadajÃ- do klidovÃ© periody a zimu pÅ™e formÄ› pupenÅ¯, cibulÃ-m podobnÃ½ch ÃºtvarÅ¯ nebo podzemnÃ-ch oddenkÅ¯. Tyto druhy se nejlÃ©pe kultivujÃ- v chladnÃ©m sklenÃ-ku. Za urÄ•itÃ½ch podmÃ-nek mohou bÃ½t ale pÄ›stovÃ¡ny venku nebo v paÅ™eniÅ¡ti. AvÅ¡ak ne vÅ¡echny druhy snÃ¡Å¡ejÃ- dÃ©letrvajÃ-cÃ- teploty pod 0 Â°C, a mÄ›ly by bÃ½t proto chrÃ¡nÄ›ny pÅ™ed silnÃ½m mrazem. IdeÃ¡lnÄ› se teploty pohybujÃ- v rozmezÃ- 15-30 Â°C a zimnÃ- teploty asi 0 Â°C aÅ¾ maximÃ¡lnÄ› 7 Â°C. Jako vhodnÃ© z tÃ©to oblasti se jevÃ- aldrovandka (Aldrovanda), darlingtonie (Darlingtonia), mucholapka (Dionaea), nÄ›kterÃ© zimÄ› odolnÃ© rosnatky (Drosera), tuÄ•nice (Pinguicula) severnÃ- polokoule - mÃ-rnÃ©ho pÃ¡su, stejnÄ› jako vÅ¡echny druhy Å¡pirlic (Sarracenia).

-

Oblasti subtropÅ¯

Druhy subtropickÃ©ho pÃ¡su vyÅ¾adujÃ- teplÃ© lÃ©to s lehkÃ½mi poklesy a studenÃ© zimy bez mrazÅ¯. LetnÃ- teploty se m pohybovat mezi 20-35 Â°C, v zimÄ› asi 8-15 Â°C. TakÃ© rozdÃ-ly v dÃ©lkÃ¡ch dne jsou u mnohÃ½ch druhÅ¯ vÃ½znamnÃ©, p na nich zÃ¡visÃ- tvorba zimnÃ-ho olistÄ›nÃ-, kvÄ›tÅ¯ a klidovÃ© obdobÃ- (viz tÃ©ma SvÄ›tlo). Pro zde jmenovanÃ© druhy se h temperovanÃ½ sklenÃ-k, mohou bÃ½t vÅ¡ak pÄ›stovÃ¡ny i ve vnitÅ™nÃ-ch prostorech, pokud mohou bÃ½t zajiÅ¡tÄ›ny tyto podmÃ-nky. MasoÅ¾ravky tÃ©to klimatickÃ© zÃ³ny: byblidy (Byblis), lÃ¡Ä•kovice (Cephalotus), rosnatka (Drosera), rosnolist (Drosophyllum), mexickÃ© a stÅ™edoamerickÃ© tuÄ•nice (Pinguicula) a bublinatky (Utricularia).

-

Oblasti tropÅ¯

TropickÃ© nÃ-Å¾innÃ© druhy vyÅ¾adujÃ- v prÅ¯bÄ›hu celÃ©ho roku vyrovnanÃ© vysokÃ© teploty 20-35 Â°C. Druhy tÄ›chto hodÃ- do teplÃ©ho sklenÃ-ku nebo do k tomu urÄ•enÃ© vitrÃ-ny, terÃ¡ria. Zde je obzvlÃ¡Å¡tÄ› dÅ¯leÅ¾itÃ© vÄ›trÃ¡nÃ-, neboÅ¥ teploty a stojatÃ½ vzduch pÅ™inÃ¡Å¡Ã- zvÃ½Å¡enÃ© nebezpeÄ•Ã- vzniku chorob. V tÃ©to oblasti se dajÃ- pÄ›stovat prakticky druhy genlisejÃ- (Genlisea), nÃ-Å¾innÃ© druhy rodu Nepenthes (lÃ¡Ä•kovka), spolu s tropickÃ½mi zÃ¡stupci tuÄ•nic (Pinguicula bublinatek (Utricularia).

Druhy z tropickÃ½ch hornatÃ½ch oblastÃ- vyÅ¾adujÃ- dennÃ- teploty od 20 do max. 30Â Â°C a zÃ¡roveÅˆ i pokles teploty v no na 12-15Â°C. Sem patÅ™Ã- bromÃ©lie (Brocchinia), vÅ¡echny druhy heliamfor (Heliamphora), vysokohorskÃ© lÃ¡Ä•kovky (Nepenthes), nÄ›kterÃ© druhy rosnatek (Drosera), genliseje (Genlisea) a bublinatky (Utricularia), rostoucÃ- ve vyÅ¡Ã-ch polohÃ¡ch.

V zÃ¡sadÄ› je potÅ™eba dÃ¡vat pozor obzvlÃ¡Å¡tÄ› v lÃ©tÄ›, aby teploty nestoupaly pÅ™Ã-liÅ¡ vysoko. Jenom mÃ¡lo druhÅ¯ sn dÃ©letrvajÃ-cÃ- teploty vyÅ¡Ã¡Ã- neÅ¾ 35 Â°C. V rubrice Rody & druhy se nachÃ¡zÃ- Ãºdaje o pÅ¯vodu a vÃ½Å¡kovÃ© poloze jednotlivÃ½ch druhÅ¯. Na zÃ¡kladÄ› tÄ›chto hodnot mohou bÃ½t jednotlivÃ© rostliny pÅ™iÅ™azeny do jednotlivÃ½ch skupin.

U druhÅ¯ Nepenthes (lÃ¡Ä•kovka) je takÃ©, vedle vÃ½Å¡kovÃ½ch Ãºdajů uvedeno, zda se jednÃ¡ o nÃ-Å¾innÃ½ Ä•i vysokoh

druh.

- OSVÄšTLENÃ•
- ZÃ•LIVKA
- VZDUÅ NÃ• VLHKOST

Â©Markus Welge

T: Alexander SjatkovskÃ½