

VĀ½prava za IĀĀ•kovkami

PĀ™Ā-spĀvek pĀ™idal Radek Kastner
[12.06.2008]
AktualizovĀĵno [12.06.2008]

MiloĀĵ Ā ula (MasoĀ¼ravĀ© rostliny 1-2008)

NedĀĵvno mi poslal

kamarĀĵd z IndonĀ©sie fotografie vzĀĵcnĀĵĀĀ-ch druhĀĀ IĀĀ•kovek z expedice, kterou podnikl minulĀ½ rok společnĀĵ s organizacĀĀ- "Nepenthes Division of Indonesia" a o kterĀ© bych se rĀĵd podĀĵlil i s VĀĵmi. K fotografiĀĀ-m pĀ™ipojuji i krĀĵtkĀ½ komentĀĵĀ™, kterĀ½ popisuje prostĀ™edĀĀ-, ve kterĀ©m byy IĀĀ•kovky pozorovĀĵny. Z bezpeĀnostnĀĀ-ch dĀĵvodĀĀ- zde nenĀĀ- uvedena pĀ™esnĀĵ lokalita vĀ½skytu kvĀĵli mnoĀ¼ĀĀ-m se "sbĀĵraĀĀ-m" IĀĀ•kovek, kteĀ™ĀĀ- si na Ā¼ivobyĀĀ-pĀ™ivydĀĀIĀĵvajĀĀ- jejich nelegĀĵlnĀĀ-m sbĀĵrem a prodejem.

N. sp. #1 Sumatra "LG" (Padang Sidempuan - Gunung Pangulubao - SevernĀĀ- Sumatra)

Tento druh byl nalezen zhruba o 100 m nĀĀ-Ā¼e neĀ¼ novĀĵ objevenĀĵ lokalita N. dubia, tj. 1500 m.n.m. Na prvĀĀ- pohled spadĀĵ do skupiny N. bongso, N. spathulata, N. singalana, N. densiflora, ale pĀ™mi bliĀ¼ĀĀ-m zkoumĀĵnĀĀ- neodpovĀĀ-dal popisu ani jednoho z vĀ½Āĵe uvedenĀ½ch druhĀĀĀ. JejĀĀ-m typickĀ½m znakem jsou 2 vĀ½ĀĵnĀĵlky na spodnĀĀ- stranĀĀ vĀĀ-ka trĀĀĀ-cĀĀ- dopĀ™edu a dalĀĀĀ- vĀ½ĀĵnĀĵlek nachĀĵzejĀĀ-cĀĀ- se smĀĵrem k zadnĀĀ- ĀĀĵsti vĀĀ-ka. V okolĀĀ- se nenachĀĵzely Ā¼ĀĵdnĀ© jinĀ© druhy kromĀĀ N. dubia. LĀĀ•kovka rostla vĀ½hradnĀĀ epifytnĀĀ ve vĀ½Āĵce kolem 15 m v korunĀĵich stromĀĀĀ.

Nepenthes sp. #1 Sumatra "LG"

FotoĀ©Alfindra Primaldhi

N. dubia (Padang Sidempua
- Gunung Pangulubao - SevernĀĀ- Sumatra)

Tento nĀĵdhernĀ½ druh byl objeven na novĀ© dosud neznĀĵmĀ© lokalitĀĀ v nadmoĀ™skĀ© vĀ½Āĵce 1600 m. n. m. Na pĀĵvodnĀĀ- lokalitĀĀ Gunung Talakmau se vyskytuje od nadmoĀ™skĀ© vĀ½Āĵky 1800 m. n. m. a donedĀĵvna byla tato lokalita povaĀ¼ovĀĵna za jedinĀ© mĀĀ-sto vĀ½skytu tohoto druhu. NovĀĵ lokalita se nachĀĵzĀĀ- cca 100 km od lokality pĀĵvodnĀĀĀ. Pokud by se podaĀ™ilo N. dubia z tĀ©to lokality zavĀĀst ĀĀsem do kultury, urĀĵitĀĀ by to pĀĵstitelĀ© ocenili, jelikoĀ¼ je tato forma mĀĀnĀĀ nĀĵroĀĀnĀĵ na noĀĀnĀĀ- poklesy teplot. Tento druh rostl na zemi v porostu mechĀĀ, raĀĵelinĀĀ-kĀĀ a organickĀ½ch zbytkĀĀĀ.

Nepenthes dubia

Foto © Alfindra Primaldhi

N. lingulata (Padang
Sidempuan - Gunung Pangulubao - SevernĀ- Sumatra)

Tento nedĀĭvno objevenĀ½ druh byl nalezen v nadmoĀ™skĀ© vĀ½Āĭce od 1600 - 1900 m.

n. m. V niĀ¾Āĭch polohĀĭch tvoĀ™il jen malĀ© (do 15 cm) protĀĭhlĀ© lĀĭĀ•ky.

NejvĀ›tĀĭĀ- lĀĭĀ•ky (do 30 cm)

mĀ›ly rostliny na samotnĀ©m vrcholku hory. Lokalita byla velice vĀ›trnĀĭ, vlhkĀĭ

(tĀ©mĀ›Ā™ 100% R/V) a chladnĀĭ. Teploty pĀ™es den dosahovaly maximĀĭlnĀ› 15 Ā°C.

VĀ›tĀĭjina semenĀĭĀ•kĀ- rostla v porostech raĀĭelinĀ-kĀ- na zastĀ-nĀ›nĀ½ch mĀ-stech. SamotnĀ½

nĀĭzev lĀĭĀ•kovky vznikl z latinskĀ©ho slova 'lingula' - Ā•ep, kterĀ½ Ā•nĀ- z vĀ-Ā•ka a

dĀĭvĀĭ tak lĀĭĀ•kĀĭm tohoto druhu nezamĀ›nitelnĀ½ vzhled. PodobnĀ½ vĀ½rĀ stek, ale mnohem

kratĀĭĀ-, mĀĭ mnoho dalĀĭĀ-ch druhĀ- jako tĀ™eba *N.*

izumiae, *N. chaniana* atd. ĀšĀ•el

tohoto vĀ½rĀ-stku je bohuĀ¾el zatĀ-m zahalen tajemstvĀ-m. ZĀ™ejmĀ› se bude jednat o

hĀ™Ā-Ā•ku pĀ™Ā-rody slouĀ¾Ā-cĀ- k nalĀĭkĀĭnĀ- hmyzu nad stĀ™ed lĀĭĀ•ky, odkud hmyz snadno

sklouzne do lĀĭĀ•ky, aniĀ¾ by se pĀ™i pĀĭdu mohl zachytit o stĀ›nu lĀĭĀ•ky. Potravu po

prozkoumĀĭnĀ- nĀ›kolika lĀĭĀ•ek tvoĀ™ili pĀ™edevĀĭ-m pavouci a malĀ- brouci. Tento druh

rostl na zemi v porostu raĀĭelinĀ-kĀ-, mechĀ- a organickĀ½ch zbytkĀ-.

Nepenthes lingulata

Foto © Alfindra Primaldhi

N. sp. #2 Sumatra "LG" (Padang Sidempuan - Gunung Pangulubao - SevernĀ- Sumatra)

Tento druh byl nalezen v nadmoĀ™skĀ© vĀ½Āĭce 1800 Ā€ 1900 m. n. m. V blĀ-zkosti se vyskytovala pouze *N. rhombicaulis*,

jejĀ-Ā¾ areĀĭl zasahoval do 1500

m. n. m. Tvarem lĀĭĀ•ek je tento druh podobnĀ½ *N. rhombicaulis*, ale pĀ™i pohledu na

celou rostlinu je jasnĀ©, Ā¾e s *N. rhombicaulis*

toho moc spoleĀ•nĀ©ho nemĀĭ. Tento druh mĀĭ kĀ™ehkĀ½ kruhovĀ½ stonek (stonek i listy

se snadno zlomĀ- pĀ™i ohnutĀ-). *N. rhombicaulis*

mĀĭ stonek hranatĀ½ a pevnĀ½ a takĀ© se podstatnĀ› liĀĭĀ- tvarem listĀ-. Na obrĀĭzku lze

vidĀ›t, Ā¾e novĀ½ druh mĀĭ listy podobnĀ© spĀ-Āĭje *N.*

rajah. Tento druh rostl na zemi v porostu mechĀ-, raĀĭelinĀ-kĀ- a organickĀ½ch

zbytkĀ-.

Nepenthes sp. #2 Sumatra "LG"

Foto © Alfindra Primaldhi

N. jamban (Padang
Sidempuan - Gunung Pangulubao - SevernĀ- Sumatra)

PĀ™i vĀ½pravĀ› byl tento druh pozorovĀĭn v nadmoĀ™skĀ© vĀ½Āĭce zhruba 1900 m.

n. m. spoleĀ•nĀ› s *N. lingulata*.

Lokalita byla velice vĀ›trnĀĭ, vlhkĀĭ (tĀ©mĀ›Ā™ 100% R/V) a chladnĀĭ. Teploty pĀ™es den

dosahovaly maximĀĭlnĀ› 15 Ā°C.

VĀ›tĀĭjina semenĀĭĀ•kĀ- rostla v porostech raĀĭelinĀ-kĀ- na zastĀ-nĀ›nĀ½ch mĀ-stech.

Nepenthes jamban

Foto © Alfindra Primaldhi

Použití zdroje (informace
o lokalitách + fotografie):

Alfindra Primaldhi

společnost Indonesian Division of Nepenthes