

Rozšíření rodu *Philcoxia* a status ochrany

Přispěvek páně Radek Kastner

[05.09.2012]

Aktualizováno [05.09.2012]

Tyto druhy rostou v různých

oblastech Brazílie v horských savanách a pustinných oblastech.

Â

Philcoxia minensis

Philcoxia

bahiensis: Vyskytuje se poblíž Piatã, ve státě Bahia,

v pohoří Serra do Atalho, v hluboké části horských savan. Tato

rostlina byla pozorována jak roste v rozsáhlých, téměř jednoduchých

stanovištích páně itálie, která souvisá s diamantovými doly.

Philcoxia minensis

Philcoxia goiasensis: Známá pouze z typové lokality ve státě Goiás, z hlubokého

části pustinné oblasti. Nebyla spatřena od doby svého nálezu a sběru

v roce 1966.

Philcoxia minensis

Philcoxia minensis: Vyskytuje se v pohoří Serra do Cabral, ve státě Minas

Gerais a to jak v oblastech narušených dálnicemi, tak na ložiscích

banířské části.

Â

Philcoxia minensis

O rozšíření rodu *Philcoxia* - druh je známo opravdu velmi málo. I když se obecně

předpokládá, že se všechny druhy vyskytují ve velmi malých oblastech a tím

přijde se jedná o jejich potenciální ohrožení. *Philcoxia bahiensis* se

už na své typové lokalitě nevyskytuje, vzhledem

k tomu, že zde došlo k mnoha změnám způsobených lidskou činností (zvláště

potom vytvořením plantáží a využitím prostoru pro pastvu). Těžba páně a budování

silnic jsou dalšími důvody pro obavy. Na druhou stranu byly tyto rostliny

pozorovány jak pronikají do lokalit, která byly opuštěny po dolování. Tyto

oblasti mohou mít určitě ruderalní (rumiální) znaky, z nichž mohou

rostliny prospívají ve chvíli, kdy jde o antropogenní (lidskou činnost) změny; stanoviště.

Â

*Philcoxia minensis*Â

Page citations:Â Fritsch, P.W.,Â et al. 2007; Pereira, C.G. and Oliveira, R.S. 2010; Taylor, P.,Â et al. 2000.Â

Revised: January 2012

Â©Barry Rice, 2005

Photo:Â <http://wuwei1101.popo.blog.163.com/blog/static/4867086720126324757920/>Â

T: Radek KastnerÂ